

1.ตนเอง

วัยรุ่นเป็นวัยที่สมองยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ จึงหลงผิดได้ง่าย เกิดการทดลองใช้สารเสพติด



2.ครอบครัว

หากมีสมาชิกในครอบครัวใช้สารเสพติดย่อมทำให้สมาชิกที่อายุน้อยเลียนแบบได้รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทำให้ทุกขใจจึงหันไปหาสิ่งชดเชยความสุขทางใจจากสิ่งอื่น



4ปัจจัยหลัก

ทำให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติด

3.เศรษฐกิจ

ขาดรายได้ มีหนี้สิน ว่างงาน ทำให้เกิดความเครียด จึงหันมาใช้สารเสพติดเพื่อหลีกหนีความเครียด



4.สิ่งแวดล้อม

อาศัยอยู่ท่ามกลางผู้ที่เสพยาหรือแหล่งที่เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายย่อมทำให้อยากรู้อยากลอง

ปรึกษาปัญหา ยาเสพติด
ติดต่อที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือที่สายด่วนยาเสพติด โทร 1165



ยาเสพติดในวัยรุ่น

ประเภทของยาเสพติด

- ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ฟีน มอร์ฟีน เฮโรอีน เซโคบาร์บิทาต (บาร์บิทูเรต) เหล้าแห้ง หรือโซโคบาล ทำให้ประสาทมึนชา สมอ อารมณ์ จิตใจ เฉื่อยชา
- ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคเคน พวักยาม้า ยาขยัน กระตุ้นเร่งประสาททำให้เกิดนิวตื้นตัว กระวนกระวายประสาทไหวตัวอยู่เสมอ
- ออกฤทธิ์หลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ทำให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติ
- ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน ทั้งกดประสาท กระตุ้นประสาท และหลอนประสาท เช่น กัญชา

อาการ

เด็กที่ติดยาเสพติดมีลักษณะอาการที่สังเกตเห็นได้หลายชนิด ทั้งทางด้านร่างกายและพฤติกรรมแสดงออกดังนี้

- หน้าตาเฉยเมยแบบคนที่มีอาการทุกข์
- ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม
- ความประพฤติเปลี่ยนไป ละเลยกิจวัตรประจำวัน ระเบียบวินัยลดหย่อน
- กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว ผิดปกติ โมโหง่าย
- มีลัษณ์ซึมเศร้า ชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ
- เบื่อหน่ายการเรียนและการเรียน ไม่มีแรง อ่อนเพลีย
- มักมียา อุปกรณ์แปลกๆ เก็บไว้ในห้องส่วนตัว
- อาจมีอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น กระดาษ ตะกั่ว หลอดกาแพ ไม้ขีด หลอดฉีดยา เป็นต้น
- ใช้เงินเปลืองผิดปกติ มีหนี้สิน บางครั้งขโมย
- สวมแว่นกันแดดตลอดเวลา เพื่อซ่อนแก้วตาที่ขาว เบิกกว้างหรือริบหรี่
- ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยา
- มักชอบอยู่ในห้องเก็บของ ซ่อนตัวอยู่ในห้อง อยู่หลังส้วมเพื่อแอบสูบบุหรี่ เสพยา
- ถ้าอยู่ในห้องเรียน เด็กจะเกียจคร้าน ง่วงหงาวหาวนอน ตาหรี่ เพราะสู้แสงไม่ได้ เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

สาเหตุของการติดยาเสพติด

- ทางด้านร่างกาย การจัดหาหรือซื้อสารเสพติดด้วยตนเองเนื่องจากมีอาการเจ็บปวดทางร่างกาย พวกเขาจะหาตนเอง เช่น ประสบอุบัติเหตุแพทย์ให้ยาระงับปวดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ภายหลังได้ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยตนเองเลยทำให้ติดยาโดยไม่ตั้งใจ
- ทางด้านจิตใจ พวกเขาบุคลิกภาพผิดปกติ เช่น ต่อต้านสังคม ก้าวร้าว ชอบพึ่งพาผู้อื่น แยกตัวเองหรือซึมเศร้า พวกเขาที่มีความกังวลใจ หวาดกลัว หรือป่วยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตมีอาการนอนไม่หลับ มักใช้ยาเสพติดระงับความรู้สึกจึงทำให้ติดได้ สภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่เข้าใจกัน เด็กขาดความอบอุ่น หรืออบรมเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง หรือมีคนในครอบครัวติดสารเสพติด
- ทางด้านสังคม ถูกเพื่อนชวน อยากลอง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับพวกติดสารเสพติด ความกดดันทางสังคม เช่น มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่มีงานทำ